


# WS 2010/11 Geometrie 1 LB Übungen Blatt 4

Notiztitel

12.11.2010

T10

a)



gegeben:

Mittelpunktswinkel  $\mu$  des Bogen AB

(Winkel um den A um M nach B)  
(gedreht werden muss)

Peripheriewinkel  $\gamma$  von C E Bogen BA

(Peripherie Kreisbogen BA gestrichelt)

Behauptung:  $\mu = 2\gamma$

Betrachte Spezialfälle: Geraden

AC (bzw. BC) sind Kreisdurchmesser



Behauptung gilt dann, da im gleich-

schenkligen Dreieck  $MBC'$  ( $MAC''$ ) beide

Basenwinkel gleich  $\gamma$  sind und damit

$\mu = \sphericalangle AMB = 2\gamma$  (Außenwinkel ist Summe der nicht anliegenden Innenwinkel)

Betrachte daher den Kreisdurchmesser CD:



Dann gilt über den Kreisbögen

Kreisbogen  
↓

AD:  $\mu_1 = 2 \cdot \gamma_1$

DB:  $\mu_2 = 2 \cdot \gamma_2$

⇒


$\mu = \mu_1 + \mu_2 = 2(\gamma_1 + \gamma_2) = 2\gamma$  falls  $C \in C'C$

$\mu = \mu_2 - \mu_1 = 2(\gamma_2 - \gamma_1) = 2\gamma$  falls  $C \in BC'$

$\mu = \mu_1 - \mu_2 = 2(\gamma_1 - \gamma_2) = 2\gamma$  falls  $C \in C''A$

b) Da der Mittelpunktswinkel  $\mu$  fest bleibt, gilt nach a) dass für alle  $C \in \text{Bogen BA}$  (Peripheriebogen):  $\gamma = \frac{\mu}{2} = \text{const.} \checkmark$


Beachte! Ersetzt man „Bogen AB“ durch „Strecke AB“, so muss man unterscheiden, ob M und C auf derselben Seite der Geraden AB liegen oder nicht. Satz des Thales als Spezialfall?



Betrachtet man die Tangente in A an  $u$ , und ihren Schnittpunkt D mit dem Mittellot von A und B, so gilt im rechtwinkligen Dreieck AMD:  $\angle AMD = \angle BAD = \gamma$ .

Damit erhält man „umgekehrt“  $u$  bei gegebener Strecke AB und Winkel  $\gamma$ , zunächst als Kreispaar symmetrisch

zu AB, eindeutig bei Verwendung orientierter Winkel  
 $\angle ACB \begin{cases} > 0 & \text{gegen} \\ < 0 & \text{im} \end{cases}$  Uhrzeigersinn. vgl. T10-Umkehr 2.ggb



gegeben sei ein Dreieck ABC mit gegebener Strecke  $c = AB$  und  $\angle ACB = \gamma$   
 Dann gilt nach b) für alle Punkte  $C' \in u$  (Umkreis des Dreiecks ABC) auf derselben Seite von AB wie C:  
 $\angle AC'B = \gamma$ . (o.E.  $\gamma \leq 90^\circ$ )

Sei D ein Punkt auf derselben Seite von AB wie C mit  $D \notin u$ .  
 Dann schneidet die Gerade AD (oder BD) den Umbreimbogen  $u$  in einem Punkt  $C'' \neq A$  (bzw.  $C'' \neq B$ ) mit  $\angle AC''B = \gamma$



Mit  $\varepsilon = \angle BDC'' \neq 0$  gilt für den Außenwinkel des Dreiecks  $BDC''$ :

$$\gamma = \angle AC''B = \gamma + \varepsilon > \gamma \quad \checkmark$$

$$\text{Umw. } \angle ADC'' \neq 0 \Rightarrow \gamma = \angle BC''A = \gamma + \varepsilon > \gamma \quad \checkmark$$

Vgl. auch T10-Uhr.ggb


T11



Behauptung:  $a \cdot b = c \cdot d$

gegeben: Kreis mit  
2 Sehnen AB und CD,  
die einander schneiden  
 $S = AB \cap CD$   
(S innerhalb des Kreises)

Mit Hilfe des Peripheriewinkel satzes gilt:




Über dem Bogen AD:

$$\sphericalangle ABD = \sphericalangle ACD = \varepsilon$$

Über dem Bogen BC:

$$\sphericalangle BAC = \sphericalangle BDC = \varphi$$



Mit dem Scheitelwinkel  $\sphericalangle ASC = \sphericalangle DSB$  sind die Dreiecke  
ASC und DSB winkeligleich (zueinander ähnlich)

$$\text{d.h. } a:c = d:b \Rightarrow a \cdot b = c \cdot d \quad \text{qed}$$

Bemerkungen: 1) Offenbar ist für jede Sehne durch S  
das Produkt der Sehnenabschnitte gleich (Verschiebe C)

2) Ist CD ein Kreisdurchmesser,  
so gilt mit  $r = MC = MD$  und  $s = SM$ :  
 $c \cdot d = (r+s) \cdot (r-s) = r^2 - s^2 = \text{const}$

3) Der Satz gilt auch, falls sich  
die Geraden AB und CD außer-  
halb des Kreises schneiden.  
(vgl. Sekanten/Tangentensatz)

